

## بررسی تاکسونومیک سخت بال پوشان تاول زا (*Coleoptera: Meloidae*) در شهرستان اراک، ایران

آتنا فرجی<sup>۱</sup>، شاهرخ پاشایی راد<sup>۲</sup>، علیرضا شایسته فر<sup>\*</sup><sup>۳</sup>

۱. کارشناس ارشد، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

۲. دانشیار، دانشکده علوم زیستی، اوین، دانشگاه شهید بهشتی تهران

۳. استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه اراک

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۰۹/۰۹، تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱)

### چکیده

در بررسی تاکسونومیک سخت بال پوشان خانواده *Meloidae* در شهرستان اراک، در بهار و تابستان ۱۳۸۹، پانزده گونه سخت بالپوش تاول زا متعلق به دو زیرخانواده *Nemognathinae* و *Hycleus*، سه قبیله *Nemognathini* و *Lyttini* و *Mylabrinii* و شش جنس *Meloinae* و *Alosimus* و *Mylabris* جمع آوری و شناسایی گردید. در این مطالعه پراکنش جغرافیایی و کلید شناسایی بعضی از گونه های سخت بالپوش های تاول زا بررسی شده است. گونه *Calydus ornaticollis* از اراک و گونه *Teratolytta flavipes* برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. صفات ریخت شناسی مانند سطح زیرین میان قفسه سینه، شاخک، پیش گرده و ویژگی های اندام تولید مثلی نر، از جمله مشخصات کلیدی در تشخیص و شناسائی بودند.

**واژه های کلیدی:** کلید شناسایی، *Meloidae*، سخت بالپوش های تاول زا، شهرستان اراک

## مقدمه

طبقه بندی ارائه شده توسط Bologna & Pinto

(1991، 2001)، این خانواده در دنیا شامل چهار زیر

Nemognathinae Meloinae خانواده

Eleticinae و Tetraonyicinae می‌باشد.

باتوجه به گزارش‌های محدود، پراکنده و غیر

رسمی، در خصوص مشاهده بعضی گونه‌های

خانواده سخت بالپوش‌های تاول زا موسوم به

Meloidae در نقاط مختلف ایران و خصوصاً منطقه

استان مرکزی، هنوز هیچگونه آمار دقیق و قابل

استنادی از تعداد دقیق گونه‌های سخت بالپوش

های اخیر در دسترس نمی‌باشد. در پژوهش حاضر

با توجه به اهمیت اقتصادی-کشاورزی این خانواده،

هدف اصلی، مطالعه بیوسیستماتیکی گروه خاصی از

حشرات از خانواده سخت بالپوش‌های تاول زا و

معرفی گونه‌های موجود در این منطقه جغرافیائی

می‌باشد.

## مواد و روش‌ها

برای جمع آوری افراد این خانواده بخش‌های

مختلف شهرستان اراک، بر حسب زیستگاه، پوشش و

ارتفاع به نه ایستگاه تقسیم شد. سخت بالپوش

های خانواده‌ی Meloidae اغلب بطور دسته جمعی

خانواده Meloidae متعلق به بالاخانواده

Tenebrionoidea، یکی از بزرگترین بالاخانواده

های سخت بال پوشان است که بطور معمول

"سخت بالپوش‌های تاول زا" نامیده می‌شوند. این

خانواده در تمام نقاط دنیا به غیر از نیوزلند و قطب

جنوب پراکنده می‌باشد (Arnett *et al.*, 2002).

این حشرات در نواحی خشک، استپهای معتدل،

ساوانه‌های نیمه حاره و حاره و زیستگاه‌های باز

.(Bologna and Pinto, 2002)

سخت بال پوشان این خانواده درجهان دارای حدود

Dettner *et al.* ۱۲۰ گونه و ۳۰۰ جنس می‌باشند (

.al., 1997

سخت بالپوش‌های تاول زا علاقه مندان خاصی

دارند زیرا آنها در علوم کاربردی (همانند داروشناسی،

دامپزشکی و کشاورزی) از اهمیت ویژه ای

برخوردارند. این حشرات به علت دگردیسی اغراقی،

ترشحات دفاعی، پارازیت بودن لارو، سازش با

محیط‌های خشک، رفتارهای پیچیده جفت‌گیری و

بسیاری از صفات دیگر همواره مورد توجه بوده اند

(Pinto and Bologna, 1999). براساس آخرین

مطالعات بسیاری در خارج از ایران بر روی افراد این خانواده صورت گرفته از آن جمله مهمترین رده Kaszab (1969) بندهای توسط (Selander, Bologna (1991) و (2001) (Bologna, Bologna & Pinto ارائه شده است. (Bologna & Pinto 1991) درشناسایی جنس ها از کلید شناسایی استفاده Bologna & Pinto (1999, 2002) گردید. تایید شناسائی گونه ها در ابتدا توسط آقایان دکتر شایسته فر در دانشگاه اراک و دکتر پاشایی راد در دانشگاه شهید بهشتی انجام شد.

در این تحقیقات که در سطح شهرستان اراک انجام شد، نمونه برداری توسط آتنا فرجی از ایستگاه های حسین آباد و بغدادی، انجیرک، نمک، کور، مشهد میقان، داود آباد، امان آباد، خیرآباد، چقلی، گوار انجام گرفت (جدول ۱).

## نتایج

گونه های جمع آوری شده در این تحقیق به دو زیرخانواده Nemognathinae و Meloinae متعلق هستند، کلید شناسایی گونه ها آورده شده است و برای جنس هایی که فقط یک گونه جمع آوری شده است فقط خصوصیات مورفولوژیکی آنها نوشته شده است، برای پراکنش جهانی گونه ها از

در حال تغذیه در بخش های انتهایی گیاهان مشاهده شده و معمولاً بین ساعت ۱۰ تا ۱۵:۳۰ جمع آوری شدند. در تحقیق حاضر، جمع آوری سخت بالپوش ها بیشتر با دست و کمک شیشه هایی با دهانه گشاد و بصورت منظم در بهار و تابستان ۱۳۸۹ انجام گرفته است. برای جلوگیری از التهاب ناشی از مایع ترشح شده توسط سخت بالپوش ها از دستکش استفاده شد. نمونه برداری به صورت روزانه و هر روز در یک ایستگاه نمونه برداری انجام شد. نمونه ها در لوله های آزمایش مناسب و تمیز، جداگانه قرار داده شده و دهانه لوله توسط درپوش بسته شده و سپس کاغذ بند دار مربوط به موقعیت جغرافیائی، ساعت نمونه برداری، گیاهان منطقه و فرد نمونه گیرنده به روی درب متصل شد (شکل ۱۱). در پایان روز حشرات جمع آوری شده به محل آزمایشگاه منتقل و جهت انجماد و مطالعات بعدی درون فریزر قرار داده شدند. شناسایی گونه ها با استفاده از صفات موفولوژیکی نظیر شاخص، طرح بالپوش ها و سطح زیرین میان قفسه سینه با استفاده از استریومیکروسکوپ انجام شد. برای بررسی دستگاه تناسلی خارجی حشره نر از روش (Gupta 1971) استفاده شده است.

- تیغه پایینی ناخن ها جدا از تیغه بالایی، هر دو تیغه هم اندازه و بدون دندانه (تیغه پایینی بندرت کوتاهتر) ..... ۲

۲- پیش پهلوی میان قفس سینه بدون حاشیه جلویی، گاهی اوقات دارای شیار باریک، سطح پیش گرده بدون خط میانی (در برخی از گونه ها با یک فشردگی ساده) قلاب های پشتی لوب میانی از دور اداگوس

*Mylabris* ..... انتهای

- پیش پهلوی میان قفس سینه با حاشیه جلویی شیاردار و نسبتاً پهن، پیش گرده دارای خط میانی بسیار ظریف و یک فرو رفتگی در وسط قلاب بالایی لوب میانی اداگوس نزدیک *Hycleus*.....

کلید شناسایی جنس های جمع آوری شده در قبیله (Bologna& Pinto, 2002) Lyttini (Bologna& Giulio, 2006)  
۱- تیغه پایینی ناخن ها با یک یا دو ردیف دندان *Alosimus*.....

۲- تیغه پایینی ناخن ها صاف .....  
۲- تیغه شکمی ناخن ها متصل بهم و به راس تیغه پشتی نمی رسد *Calydus*.....

مقالات مربوط به فون Meloidae در ترکیه (Özbek & Szaloki, 1996) و چک لیست موجود در موزه حشره شناسی Lund University استفاده شده است.

#### کلید شناسایی زیر خانواده های Meloidae

۱- لوب میانی اداگوس (Aedeagus) دارای ۲-۱ قلاب، در تگومن (Tegumen) پارامرها (Paramer) فقرات تانیمه متصل بهم

*Meloinae*.....

۲- لوب میانی اداگوس بدون قلاب بوده و پارامرها اغلب بطور کامل متصل بهم .....  
*Nemognathinae*.....

#### زیر خانواده Meloinae

کلید شناسایی جنس های جمع آوری شده در قبیله (Bologna& Pinto, 2002) Mylabrini  
۱- تیغه پایینی ناخن ها چسبیده به بالایی و کوتاهتر از آن، تیغه بالایی دندانه دار، سطح زیرین میان قفس سینه در جلوه دارای ناحیه تغییر یافته، بالپوش ها و پیش گرده دارای موهای بلند و ایستاده، لوب میانی اداگوس با دو قلاب پشتی *Mylabris*.....

- ناحیه سپر مانند میانی سطح زیرین میان قفسه سینه تا کناره ها امتداد یافته، پیشانی اغلب بدون

لکه قرمز (شکل C-۲)

*quadripunctata* (Linnaeus, 1767)

- ناحیه سپر مانند میانی سطح زیرین میان قفسه سینه به کناره ها نمی رسد(شکل D-۱)، پیشانی همیشه دارای لکه قرمز، پارامرها باریک و در انتهای

کمی خمیده (شکل E,F-۱)

*variabilis*(1781)

- شاخک ها در پایه قهوه ای رنگ، پیشانی دارای دو لکه قرمز، لوب میانی با دو قلاب نزدیک به انتهای

یک شکل(شکل B-۱)

*impressa* (1837)

- شاخک ها در پایه قهوه ای رنگ، پیشانی بدون لکه قرمز، سطح زیرین میان قفسه سینه دارای ناحیه

- سپر (شکل F-۳)، پارامرها باریک (شکل

*olivieri* (Pallas, 1781).....(E

- پیش گرده در جلو بدون فرو رفتگی عرضی،

بالپوش ها همیشه با ۵ لکه، ناحیه سپر مانند میانی

- تا میان پهلو کشیده شده(شکل ۲

( Soumacov, 1924).....(F

*fabricii*

- تیغه شکمی ناخن ها از تیغه پشتی جدا است، هر

*Teratolytta*.....

کلید شناسایی گونه های جنس (*Mylabris* 1775)

*bricius*, (Fa

1- سطح زیرین میان قفس سینه بدون ناحیه سپر

مانند، منقوط مودار و یا صاف بدون مو در قسمت

میانی ..... ۲

- سطح زیرین میان قفس سینه بدون ناحیه سپر

مانند(شکل ۳- D) دربخشی از ران و ساق پاها

*Klugi* (Redtenbacher, .....)

1850)

۲- ناحیه سپر مانند میانی منقوط و مو

دار ..... ۳

- ناحیه سپر مانند میانی صاف و بدون


مو ..... ۴

- انتهای بالپوش ها با نوار پهن

سیاه ..... ۶

- انتهای بالپوش ها بدون نوار پهن


سیاه ..... ۵



- پیش گرده در جلو با فرو رفتگی عرضی،  
بالپوش ها دارای لکه و نوار(گاهی بدون نوار  
انتهایی)، سطح زیرین میان قفسه سینه تا انتهای  
کشیده شده (شکل ۴-D)، لوب میانی قفسه  
سینه با دو قلاب تقریبا دور از انتهایها (شکل ۴-  
( Olivier, 1795) .....(C  
*cincta*

:B ,A: *Mylabris quadripunctata* -۲

تگومن؛ پشتی و جانبی، C: سطح زیرین میان قفسه  
سینه. D, E: *Mylabris fabricii*. تگومن؛ پشتی و  
جانبی، F: سطح زیرین میان قفسه سینه.



شکل ۱-۱ :A :*Mylabris impressa*، B: تگومن،  
لوب میانی، C: سطح زیرین میان قفسه سینه.  
D, E: *Mylabris variabilis*  
جانبی، F: سطح زیرین میان قفسه سینه.

پراکنش: حوضه مدیترانه، مجارستان و جمهوری چک، اتریش، فرانسه، سوئیس و ایتالیا، ایران (Danielsson, 2008)

### *Mylabris quadripunctata* - ۳ گونه

محل جمع آوری: حسین آباد و بغدادی، انجیرک، امان آباد، بان، گوار (اردیبهشت - شهریور ۱۳۸۹).

پراکنش: در جنوب فرانسه و ایتالیا، جنوب بالکان، جنوب روسیه، جمهوری های آسیای مرکزی (ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان)، ترکیه، سوریه، هندوستان، قفقاز، ایران و افغانستان (Danielsson, 2008).


### *Mylabris fabricii* - ۴ گونه

محل جمع آوری: نمک کور (فروردین ۱۳۸۹).  
 پراکنش: ایتالیا، اسرائیل، فرانسه، آلمان، آذربایجان، ایران، افغانستان، ترکمنستان، سوریه، Danielsson (2008)

### *Mylabris klugi* - ۵ گونه

محل جمع آوری: حسین آباد و بغدادی، انجیرک (اردیبهشت و خداد ۱۳۸۹).

شکل ۳ - A, B : *Mylabris klugi* : تگومن؛ پشتی و جانبی، C: لوب میانی، D: سطح زیرین میان قفسه سینه. E: *Mylabris olivieri* : تگومن؛ جانبی، F: سطح زیرین میان قفسه سینه.



شکل ۴ - A, B: *Mylabris cincta* : شکمی، پشتی، C: لوب میانی، D: سطح زیرین میان قفسه سینه. گونه های مطالعه شده:

### *Mylabris impressa* - ۱ گونه

محل جمع آوری: حسین آباد و بغدادی، انجیرک، نمک کور، امان آباد، خیرآباد، بان، گوار (فروردین - شهریور ۱۳۸۹).

پراکنش: بلغارستان، ترکیه، مقدونیه، پرتغال، اکراین، روسیه، یونان، ایران (Danielsson, 2008)

### *Mylabris variabilis* - ۲ گونه

محل جمع آوری: حسین آباد و بغدادی، انجیرک، امان آباد (خرداد، تیر، مرداد ۱۳۸۹).

-بندهای دهم و یازدهم شاخک غیرفسرده، لوب  
میانی با دو قلاب نزدیک به  
نتها.....۲

-۲- بند یازدهم شاخک هم عرض بند دهم(شکل  
D)، سطح زیرین میان قفسه سینه بدون ناحیه  
Marseul, ).....(E-۶ سپرمانند (شکل ۶

*javeti* (1870

- بند یازدهم شاخک کم عرض تر از بند  
دهم(D-۵)، پیش پهلوی میان قفسه سینه با  
حاشیه جلویی شیاردار نسبتاً پهن(E-۵)، لوب  
میانی با دو قلاب، قلاب بالای نزدیک به  
نتها(F-۵) (شکل ۵ Redtenbacher, )

*colligatus* (1850


-۳- سطح زیرین میان قفس سینه دارای ناحیه سپر  
مانند با گسترش زیاد در قسمت میانی(B-۵)،  
بند دهم و یازدهم شاخک بهم فشرده(A-۵)،  
قلاب لوب میانی نزدیک به انتهای(C-۵) (شکل ۵

*Scabiosae* (Olivier, 1811)

A

B

C



پراکنش: ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکمنستان، ایران  
وافغانستان، ماوراء خزر (Danielsson, 2008)

#### ۶- گونه *Mylabris olivieri*

محل جمع آوری: حسین آباد و  
بغدادی، انجیرک، نمک کور، امان  
آباد، خیرآباد، بان، گوار (فروردین-شهریور ۱۳۸۹).

پراکنش: یونان، مقدونیه، ترکیه، روسیه، اکراین،  
رومانی، آذربایجان، ایران (Danielsson, 2008)

#### ۷- گونه *Mylabris cincta*

محل جمع آوری: حسین آباد و بغدادی، انجیرک  
(اردیبهشت، خرداد و مرداد ۱۳۸۹).

پراکنش: آذربایجان، ترکیه، فرانسه، ایتالیا، اسلوواکی،  
سوئیس، چک، آلمان، لیبی، ایران (Danielsson, 2008)

#### کلید شناسایی گونه های جنس *Hycleus* (Latreille, 1817)

۱- بند های دهم و یازدهم شاخک بهم فشرده  
(شکل ۶) لوب میانی با دو قلاب نزدیک به انتهای  
و متفاوت (شکل ۶B)، پیش پهلوی میانی قفسه  
سینه با حاشیه جلویی شیاردار(شکل ۶-  
*fuscus* (Olivier, 1811).....(C

*Hycleus scabiosae* - ۱

محل جمع آوری: حسین آباد و بغدادی، انجیرک، نمک کور، امان آباد، خیرآباد، بان، گوار، مرزیجران (فروردین - شهریور ۱۳۸۹).

پراکنش: بالکان، قسمت اروپایی روسیه، ترکیه، قفقاز، سوریه، آسیای میانه، مغولستان، عراق، ایران، افغانستان (Danielsson, 2008).


*Hycleus colligatus* - ۲

محل جمع آوری: حسین آباد و بغدادی، انجیرک، نمک کور، امان آباد، خیرآباد، بان، گوار (فروردین - شهریور ۱۳۸۹).

*Hycleus fuscus* - ۳


محل جمع آوری: حسین آباد و بغدادی، انجیرک، مشهد میقان (اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۸۹).

پراکنش: ایتالیا، فرانسه، روسیه، ایران، سوریه، عراق (Danielsson, 2008)

*Hycleus javeti* - ۴

شکل ۵ - *Hycleus scabiosae*: A: شاخک، B: سطح زیرین میان قفسه سینه، C: لوب میانی. D: سطح زیرین میان قفسه سینه، E: شاخک *Hycleus colligatus* میان قفسه سینه، F: لوب میانی.

## A B C




## D E



شکل ۶ - *Hycleus fuscus*: A: شاخک، B: لوب میانی، C: سطح زیرین میان قفسه سینه. D: سطح زیرین میان قفسه سینه، E: شاخک *Hycleus javeti* میان قفسه سینه.

گونه های مطالعه شده:


<p><i>Alosimus armeniacus</i> ۱-گونه</p> <p>محل جمع آوری: نمک کور (فروردین ۱۳۸۹).</p> <p>پراکنش: آفریقای شمالی، مرکز و شرق اروپا، Afghanistan, Palestine, Iran Danielsson, (2008).</p> <p>جنس (<i>Calydus</i> Reitter, 1896)</p> <p><i>Calydus ornaticollis</i> (Echerich, 1896) گونه</p> <p>بدن سیاه پوشیده باموهای ریزسیاه، بالپوش به رنگ های سیاه و قرمز یکنواخت، سر کوچک و بر روی سر یک لکه قرمز قلبی شکل، پیش گرده قرمز با دو لکه سیاه، شاخک بالای پیشانی، شاخک ۱۱ بندی، مشکی، میان قفسه سینه دارای موهای ریز، بدون ناحیه تغییر یافته فاقد ناحیه سپر مانند پیش قفسه سینه دارای حاشیه (شکل C)، پنجه پا بدون دندانه سطح پشتی در <math>\frac{1}{4}</math> به سطح شکمی می رسد. مهمیز بلندو هم اندازه، قطعه انتهایی بدن V شکل و عمیق در نرها، پارامرها کوتاه و در انتهای کمی خمیده (شکل A)، ادگوس با یک قلاب انتهایی (شکل B).</p>	<p>محل جمع آوری: حسين آباد و بغدادی، انجیرک (اردیبهشت، خرداد و شهریور ۱۳۸۹).</p> <p>پراکنش: افغانستان، ایران (Danielsson, 2008).</p> <p>جنس (<i>Alosimus</i> Mulsant, 1857)</p> <p><i>Alosimus armeniacus</i> (Faldermann, 1837) گونه</p> <p>بدن سبز متالیک، پوشیده از موهای طلایی رنگ بلند، بالپوش سبز متالیک، کامل، در انتهای زاویه دار و محدب، پیش گرده و سر با موهای مشکی بلند، پیش گرده عریض تر از طول ولی تقریباً برابر. شاخک ۱۱ بندی، لب بالایی بزرگ تا میانه های ماندیبل، میان قفسه سینه بدون ناحیه تغییر شکل یافته، فاقد ناحیه سپر مانند، پیش قفسه سینه دارای حاشیه، پنجه پا دارای ۲ ردیف دندانه، مهمیز تقریباً برابر ولی در پایه ضخیم، پارامرها نسبتاً ضخیم (شکل ۷A,B)، قطعه شکمی انتهایی در نر V شکل.</p>
---	--



شکل ۷- A,B: *Alosimus armeniacus* : تگمون؛

پشتی و جانبی

استرنوم بصورت لوله ای مخروطی شکل،  
مزوتارسومر ۱ خیلی بزرگ نیست در پایه، اداگوس با  
دو قلاب، قلاب اندوفالوس کمی دارای انحنا در  
راس(شکل -۹).



شکل ۸ : A: *Calydus ornaticollis* ، B: تگومن،

C D B A

لوب میانی، C: سطح زیرین میان قفسه سینه.



شکل -۹ : B,A: *Teratolytta* ، C: *flavipes* تگومن؛

شکمی، جانبی C: لوب میانی، D: متابروکانترپشتی .

### ۱ - گونه *Teratolytta flavipes*

محل جمع آوری: نمک کور(فروردين ۱۳۸۹).

پراکنش: سوریه، ترکیه، لبنان، Danielsson, (2008)

زیرخانواده *Nemognathinae*

جنس (*Nemognatha* Illiger, 1807)

گونه *Nemognatha* ..... (Fabricius, 1775)

*chrysomelina*

بدن قهوه ای متمايل به زرد، سطح زیرین  
قفسه سینه وشكم به جز بند انتهایي و پنجه ها

### ۱ - گونه *Calydus ornaticollis*

محل جمع آوری: نمک کور(خرداد ۱۳۸۹).

پراکنش: ترکیه، ایران، قفقاز، سوریه، عراق  
. (Danielsson, 2008)

جنس *Teratolytta* (Semenov, 1894)

گونه *flavipes* (Mulsant & Rey, 1858)

*Teratolytta*  
 بدن سبز متالیک تک رنگ، پوشیده با نبوه موهای  
 بلند و طلایی، بالپوش سبز متالیک با موهای طلایی  
 کوتاه، سر و پیش گرده هم با موهای کوتاه و  
 طلایی، شاخک سیاه، ۱۱ بندی، پیش قفسه سینه  
 بدون ناحیه تغییر شکل یافته و فاقد سپر، پیش  
 پهلوی میان قفسه سینه دارای حاشیه، پاها زرد  
 رنگ، راس تروکانتر پشتی بزرگ وسیاه با یک دسته  
 موهای بلند(شکل -۹)، تیبیا میانی در راس تغییر  
 شکل یافته به شکل قاشقی، دارای دو مهمیز، متأ

پراکنش: در مراکش، شمال الجزایر، تونس، مصر، سیسیل، ایتالیا، جنوب فرانسه، یونان، ترکیه، جنوب روسیه، قفقاز، قبرس، لبنان، سوریه، فلسطین، عربستان، عراق، مرکز و جنوب ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان, Danielsson, (2008).

## بحث

مطالعات فونوستیکی برای آمریکای شمالی، هند خاور و ناحیه مدیترانه انجام شده است، اما فون ملوئیده های ایران بصورت واقعاً ناچیزی شناسایی شده است. در مقایسه با کارهای انجام شده در دنیا، در ایران محدود به چند گزارش و پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد، اولین گزارش درباره فون ایران به مقاله Redtenbacher (1950 و ۱۹۶۰) در سال های Kaszab توسط منتشر شده است که اساساً به فهم ما درباره سخت بالپوشان خانواده‌ی Meloidae ایران کمک می کند. آخرین تحقیقات درباره این خانواده در ایران توسط Axentiev (1985) انجام شده است Mirzayans، (Nikbakhtzadeh & Tirgari, 2) در سال (1969) فهرستی از سخت بالپوش های خانواده Meloidae ایران در نشریه ایستیتوی

سیاه، با موهای سیاه، بالپوش کامل با موهای ریز سفید و طلایی انتهای بالپوش کمی سیاه و در قسمت میانی آن دارای یک لکه گرد قهوه ای در قسمت میانی آن، چشم بزرگ، گاله آتعییر شکل یافته بصورت لوله ای خرطومی و بلندتر از پالپ های آرواره ای، شاخص ۱۱ بندی، عرض پیش گرده بیشتر از طول، با یک لکه قهوه ای گرد در میانه آن، میان قفسه سینه بدون ناحیه تعییر شکل یافته، مهمیز بیرونی ساق پاهای عقب مشابه و بندرت ضخیم تر از مهمیز داخلی، تیغه پا دارای ۲ ردیف دندانه، لوب میانی اداگوس بدون قلاب و بزرگ (شکل ۱۰- C)، پارامرها باریک و کوتاه (شکل ۱۰- A, B).

A                    B                    C



شکل ۱۰ - B,A : *Nemognatha chrysomelina* - ۱۰ تگومن؛ شکمی و جانبی، C: لوب میانی .

۱- گونه *Nemognatha chrysomelina*

محل جمع آوری: داود آباد(خرداد(۱۳۸۹).

عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	ارتفاع از سطح دریا(متر)	ایستگاه های مطالعاتی
۴۹° ۴۷'	۳۴° ۰۰۳'	۱۷۵۵	حسین آباد و بغدادی
۴۹° ۴۹'	۳۴° ۰۰۱'	۱۷۸۱	انجیرک
۳۶° ۲۵'	۳۷° ۶۹'	۱۹۷۶	نمک کور
۵۰° ۰۳۹'	۳۷° ۶۶'	۲۸۷۸	مشهد میقان
۳۹° ۴۶'	۳۷° ۹۵'	۱۷۰۰	داود آباد
۳۹° ۹۸'	۳۷° ۶۳'	۱۸۰۰	امان آباد
۴۰° ۰۵۵'	۳۷° ۰۳۳'	۱۹۰۰	خیرآباد
۴۲° ۷۶'	۳۷° ۰۸۸'	۲۵۰۰	چقلی
۳۷° ۶۱'	۳۷° ۰۵۹'	۲۰۰۰	گوار

## سپاسگزاری

با سپاس از تلاش های بی وقفه و راهنمایی های ارزشمند مسئولین و پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و واحد تهران شمال، آزمایشگاه دانشگاه آزاد اراک، مدیر گروه محترم حشره شناسی دانشگاه آزاد اراک آقای دکتر وفایی شوستری، سرکار خانم شیرازی، موزه جانورشناسی دانشگاه اراک و آزمایشگاه دانشگاه اراک و با تشکر از راهنمایی های آقای Stanislav Krejcik در جمهوری چک و آقای Marco Bologna در کشور ایتالیا.

بررسی آفات و بیماریهای گیاهی به چاپ رسانده است و پایان نامه ارشد سری که به بررسی فونوستیک سخت بالپوشان Meloidae در استان تهران می پردازد، در این بررسی ۲۹ گونه از ۹ جنس شناسایی و کلید تشخیص آن ها تدوین گردیده است.

باتوجه به چک لیست های موجود در ایران به چاپ رسیده توسط Mirzayans (1969) گونه Calydus ornaticollis برای اولین بار از اراک گزارش می شود هم چنین گونه Teratolytta flavipes برای اولین بار از ایران گزارش می شود (Bologna & Giulio, 2006).



شکل ۱۱- نحوه نگهداری سخت بالپوش تاول زا

## REFERENCES:

- Arnett, R.H., Thomas, MC, Skelley, PE. and Frank, JH. American Beetles. CRC Press. Boca Raton, Florida2002; pp: 861.
- Bologna, MA., Fauna D'Italia. Edizioni Calderini, Bologna, 1991; XIV+541 pp
- Bologna, MA., & Pinto, JD., Phylogenetic studies of Meloidae (Coleoptera), with emphasis on the evolution of Phoresy, Systematic Entomolog. 2001; 26:33-72.
- Bologna, M.A., & Pinto, J.D. The old world genera of Meloidae (Coleoptera): A key and synopsis. Journal of Natural History. 2002; 36: 2013-2102.
- Bologna, MA., & Giulio, A.D., *Revision of the genus Teratolytta (Coleoptera: Meloidae)*, Eur.J. Entomol, 2006; 103, 137–161.
- Dettner, K., Bauer, G., and VlÖkl, W. Vertical Food Web Interactions. Springer Verlag. Berlin. 1997; PP: 390.
- Danielsson, R., Coleoptera: Meloidae present in the Entomological Museum of Lund University, 2008-09-03.
- Gupta, AP., External genitalia of Meloidae (Coleoptera), the genitalia and their taxonomic significance. Miscellaneous Publications of the Entomological Society of America, 1971; 8(1): 1-29.
- Mirzayans, H., Contribution A La Connaissance De L a Faune Des Clerides Et Meloidaes De Lõ Iran. Plant Pests and Diseases Research Institute. 1969, pp. 25 - 37.
- Nikbakhtzadeh, MR& Tirgari, S., Blister beetles (Coleoptera: Meloidae) in Nahavand county (Hamedan province, Iran) and their ecological relationship to other coleopteran families. Iranian J Publ Health, 2002; 31 (1-2): 55-62.
- Özbek, H., Szaloki, D., A contribution to the knowledge of the Meloidae (Coleoptera) fauna of Turkey along with new records. Tr. J. of Zoology, 1996; 22(1998) 23-40.
- Pinto, J. D. & Bologna, M.A. The new world genera of Meloidae (Coleoptera): A key and synopsis. Journal of Natural History, 1999; 33: 569-620.
- Serri, S., Pashaie Rad, Sh., Kharazi Pakdel, A., Borumand, H., An identification guide to meloid beetles (Coleoptera: Meloidae) of Tehran province. Iranian Journal of Biology, 2007: volume19 (1).

## Taxonomic study of blister beetles (*Coleoptera: Meloidae*) in Arak county, Iran

Atena Faraji<sup>1</sup>, Shahrokh Pashaie Rad<sup>2</sup>, Alireza Shayestehfar<sup>3\*</sup>

1. Msc of Biological Sciences, Islamic Azad University North Tehran
2. Associate Professor., Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University
3. Assistant Professor., Faculty of Sciences, Arak University

(Received: Nov. 30, 2012; Accepted: Jul. 11, 2012)

### Abstract

During the taxonomical investigations of Coleoptera (family: Meloidae) of the Arak County, in spring and summer 2010, 15 species of blister beetles belonging to the two subfamily (Nemognathinae and Meloinae), three tribes (Mylabrini, Lyttini and Nemognathini) and six genus (*Hycleus*, *Mylabris*, *Alosimus*, *Calydus*, *Teratolytta* and *Nemognatha*) were collected and identified. In this study the geographical distribution and identification key of the collected species of blister beetles were considered. This is the first time that *Calydus ornaticollis* species from Arak and *Teratolytta flavipes* species from Iran was reported. Morphological characters such as mesosternum, antennae, pronotum, and male reproductive organ were the main identification character that was used.

**Keywords:** Identification key, *Meloidae*, Blister beetles, Arak County

---

\* Corresponding author: Alireza Shayestehfar

Email: shayestehfar@hotmail.com