

Species Diversity of Parvar Protected Area in Semnan Province

Bagher Nezami*

Assistant Professor, Department of Natural Resources and Environment Sciences, Collage of Environment, Environmental Organization, Karaj, Iran

(Received: Oct. 14, 2017 - Accepted: Jan. 13, 2020)

Abstract

Studying on the species diversity and evaluating the variation of it during different years has had very important role in identifying the changes and weak wildlife management. In this survey we did a study on species diversity and population variation of terrestrial bird of Parvar Protected Area in Semnan province during a year. Parvar Protected Area is one of the critical habitats which have the capability of promoting a higher level of Iran protected areas category as a national park. Climate variation has led to species diversity and we could identify more than one fourth of the bird species existing in the whole country. North and northwest forests of Parvar which are the borders of Iranian Hircanian forests and Irano-touranian climate in the east and southeast where have resulted in the high species richness. We identified 161 bird species belonging to 13 orders. The most known bird species are related to the summer with 2063 pieces. 47 species are native, 21 species were identified in nesting season, 18 species were identified in winter and others were passing species. Passeriformes were dominant by 68% and Falconiformes were about 13%. We could identify only one water bird, Common Teal, and two shore birds during the study period.

Keywords: Hircanian forest, Irano touranian climate, Parvar Protected Area, Passeriformes, Species richness.

تنوع گونه‌ای پرندگان منطقه حفاظت شده پرور سمنان

باقر نظامی*

استادیار، گروه محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۲ - تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳)

چکیده

بررسی تنوع گونه‌ای و تغییرات آن در سال‌های مختلف می‌تواند راهنمایی برای شناسایی عوامل این تغییرات و سپس قدم در جهت رفع کاستی‌های مسایل مربوط به مدیریت حیات وحش باشد. در این تحقیق به شناسایی و بررسی غنای گونه‌ای پرندگان خشکی‌زی منطقه حفاظت شده پرور سمنان و نوسانات جمعیتی آنها در یک دوره یک ساله پرداخته شده است. تنوع اقلیمی در بعد کوچک بر غنای گونه‌ای منطقه بسیار افزوده است به طوری که بیش از یک چهارم پرندگان کشور را در یک دوره یک‌ساله در خود پناه می‌دهد. زیستگاه‌های جنگلی آخرین حد جنوبی هیرکانی به شمال و شمال غربی این منطقه رسیده و بخش‌های ایرانی و تورانی در جنوب و جنوب شرقی، غنای منطقه را افزایش چشمگیر داده است. حاصل این تنوع ۱۶۱ گونه پرندگان از ۱۳ راسته شناسایی شده در ایران است. بیشترین تعداد گونه نیز مربوط به فصل تابستان به تعداد ۲۰۶۳ عدد پرندگان است. از تعداد گونه‌های شناسایی شده ۴۷ گونه بومی (مقیم) تمام سال منطقه هستند و احتمالاً زادآوری دارند، ۲۱ گونه دیگر فقط در فصل زادآوری در منطقه دیده می‌شوند، ۱۸ گونه زمستان گذران و سایر گونه‌ها عبوری منطقه هستند. گنجشک‌سانان با تعداد ۶۸٪ غالباً پرندگان منطقه را تشکیل می‌دهند. پرندگان شکاری نیز ۱۳ درصد پرندگان شناسایی شده منطقه هستند. در طول یک دوره یک ساله تنها یک گونه آبری، خوتکا، و دو گونه کنار آبری شناسایی شده و مابقی همه خشکی‌زی بوده‌اند.

واژه‌های کلیدی: ایرانی و تورانی، غنای گونه‌ای، گنجشک‌سانان، منطقه حفاظت شده پرور سمنان، هیرکانی.

مقدمه

گونه‌ها، استمرار و تداوم اکوسیستم‌ها از مهمترین عوامل مؤثر بر بقا و پایداری محیط‌زیست تلقی می‌شود (Mori *et al.*, 2001; Wintoh, 1999; Smith, 1996). بنابراین حفاظت از جمعیت این پرنده‌گان نیاز به برنامه‌ریزی دارد. در سطح ملی، استان سمنان بهدلیل برخورداری از شرایط خشک و نیمه‌خشک از تنوع پرنده‌گان بسیار بالایی در همه زیستگاهها برخوردار نیست. این مناطق بهدلیل دارا بودن تنوع زیستی بالا و قرار گرفتن در شرایط زیست پهنه‌منزد از گونه‌های منحصر به‌فرد گیاهی، پرنده‌گان و پستانداران برخوردار است و از ارزش‌های اکولوژیک بسیار بالایی برخوردارند. همچنین ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی، تفریحی و فرهنگی این اکوسیستم‌ها بر کسی پوشیده نیست.

بررسی این مطالعه و شناسایی گونه‌های آن می‌تواند به مطالعات جغرافیای زیستی، بوم شناسی گونه‌ها و همچنین برنامه‌ریزی حفاظتی و مدیریتی دقیق منطقه منجر شود (Yosefi *et al.*, 2015; Safarianyan *et al.*, 2014; Krebs, 2001 مطالعات تحلیلی و کاربردی جهت دستیابی به برنامه‌ریزی برای مدیریت زیستگاه و جمعیت پرنده‌گان ضروری به‌نظر می‌رسند که به چند نمونه اشاره می‌گردد. Behrozoirad (2016) به بررسی اثر کاهش آب دریاچه ارومیه بر ترکیب جامعه و تنوع گونه‌ای پرنده‌گان آبزی تالاب کانی‌برازان پرداخت و به این نتیجه رسید که از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۴ شاخص‌های تنوع روند کاهش را نشان داده و شاخص یکنواختی افزایش داشته است، که ناشی از اثر خشک شدن دریاچه ارومیه و کم آب شدن تالاب کانی‌برازان می‌باشد. Yosefi *et al.* (2015) غنای گونه‌ای پرنده‌گان شهرستان بوئانات فارس را مورد مطالعه قرار داده و بیان داشتند که این منطقه بهدلیل دارا بودن

تنوع سیما و منظر کشور ایران، بهدلیل تضادهای اقلیمی، دامنه تغییرات ارتفاعی و موقعیت جغرافیایی آن، طیف گسترهای از زیستگاه‌ها که دامنه آنها از برف چال‌ها، یخچال‌های دائمی، ارتفاعات عمق کویر، جنگلهای بارانی معتدل‌ههای هیرکانی تا نخلستان‌ها و مانگروهای جنوب را رقم زده است. این تنوع چهره زمین فون پرنده‌گان غنی و متنوعی را در خود جای داده است.

در این مطالعه به شناسایی گونه‌های پرنده‌گان و بررسی تغییرات تنوع گونه‌ای آنها براساس شاخص‌های موجود و همچنین توجه به نوسانات جمعیتی پرنده‌گان این مناطق در یک دوره یک‌ساله پرداخته شد. با توجه به این‌که یک برنامه مدون برای سرشماری پرنده‌گان خشکی‌زی وجود ندارد، لذا نمی‌توان این آمار را با یک مرجع مقایسه کرد اما این مقاله می‌تواند برای تکمیل منابع و مراجع استان حائز اهمیت باشد و در اولویت‌بندی برنامه‌های مکانی و زمانی مدیریت به کار رود (Yazdandad, 2011).

تنوع زیستی در واقع ترکیبی از تمام گوناگونی‌های زیستی، از جمله تنوع وراثی درون‌گونه‌ای، تنوع بین گونه‌ها، اجتماعات و مجموعه بوم‌سازگان یک منطقه می‌باشد. از مهمترین سطوح تنوع زیستی تنوع گونه‌ای می‌باشد که دو فاکتور غنای گونه‌ای و توزیع فراوانی افراد (یکنواختی گونه‌ای) در تعیین آن نقش دارد و غنای گونه‌ای یا تعداد گونه در یک جامعه یا در واحد سطح، قدیمی‌ترین و ساده‌ترین راه اندازه‌گیری تنوع می‌باشد و یکنواختی چگونگی توزیع فراوانی افراد را در بین گونه‌ها نمایش می‌دهد. به عبارت دیگر، یکنواختی بیانگر میزان تعادل در فراوانی گونه‌های است. شاخص‌های هتروژنیتی اندازه‌گیری یکنواختی و غنای گونه‌ای را با هم در بر می‌گیرد (Yazdandad, 2008; Ejtahadi *et al.*, 2008). هدف اصلی از مدیریت منابع طبیعی حفظ تنوع زیستی و تداوم زادآوری در اکوسیستم‌های طبیعی است. تنوع ژنتیکی

حفاظت شده بولای مازندران است. دامنه ارتفاعی ۱۱۹۰ تا ۳۳۰۰ متر، دما و بارندگی متوسط سالیانه ۱۲ سانتی‌گراد و ۳۲۰ میلی‌متر، منطقه را دارای اقلیم نیمه‌خشک سرد تا مرطوب معتدل نموده‌اند. وجود رویشگاه‌ها و زیستگاه‌های متفاوت خزری و مرکزی در جوار هم از ویژگی‌های منطقه به‌شمار می‌رود. کوهستان‌های شمالی منطقه پوشیده از مراتع وسیع بیلاقی و جنگل کم‌نظیر هیرکانی است. بلندمازو، راش، ممرز، شیردار، نمدار، ملچ، ولیک، ارس، گلابی وحشی، زرشک، خاس، کلاه میرحسن، درمنه، گون، آویشن، گاوزبان و انواع گندمیان از گونه‌های گیاهی منطقه هستند (Darvishsefat, 2006) (نقشه ۱).

مواد و روش‌ها

شناسایی و بررسی‌های میدانی پرندگان منطقه مورد مطالعه در طول یک دوره یک سال، از ابتدای تابستان ۱۳۹۲ تا پایان بهار ۱۳۹۳، صورت گرفته است. برای شناسایی و بررسی غنای گونه‌ای پرندگان در این منطقه از روش‌های زیر استفاده شده است: (۱) مشاهده مستقیم، که با استفاده از یک دستگاه دوربین دوچشمی مدل Nikon با بزرگ نمایی ۱۰×۴۲، یک دستگاه تلسکوپ Nikon، کتاب راهنمای صحراخی پرندگان منصوری (۱۳۸۷)، کتاب راهنمای صحراخی پورتر (Porter, 1996) و کتاب راهنمای صحراخی کالینز (Svensson & Grant, 1999) انجام گرفت. ضمن شناسایی و تعیین وضعیت زیستگاهی آنها، نقاط پراکنش تک‌تک گونه‌ها با یک دستگاه GPS مدل Garmin 62s مشخص گردید. (۲) جلب پرندگان با پخش صدا. برای برخی از گونه‌های خانواده‌های راسته گنجشک‌سانان به‌ویژه خانواده سسک‌ها از جلب پرنده با استفاده از پخش صدا استفاده گردید. یک دستگاه بلندگو و دستگاه پخش صدا وسیله مناسبی است که با آن بخوبی می‌تواند پرندگان آوازخوان و شاخه‌نشین را جلب کرد. (۳) پرتوکل ثبت داده‌ها. در راستای ثبت داده‌های پرندگان یک پرتوکل واحد طراحی شده است

بوم‌سازگان‌های مختلف، از غنای گونه‌ای بالایی برخوردار است. Khani *et al.* (2014) به بررسی غنای گونه‌ای و وضعیت زیستی پرندگان شهرستان سرخس در شمال شرق ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرخس یکی از غنی‌ترین نواحی از نقطه Yazdandad (2011) به بررسی تغییرات تنوع و فراوانی پرندگان در آبی استان خراسان رضوی پرداخت و به این نتیجه رسید که روند کلی تغییرات تنوع گونه‌ای طی سال‌های آماری مشاهده شده است. Karimi *et al.* (2012) به مطالعه تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی جامعه پرندگان در تیپ‌های پوششی متفاوت جنگل شصت کلاته گرگان پرداختند و ضمن اهمیت محیط‌های جنگلی در غنای پرندگان، تأثیر فصل و تیپ‌های متفاوت پوشش جنگلی را بر تنوع زیستی جامعه پرندگان اثبات نموده و به این نتیجه رسیدند که در فصل سرما تیپ گیاهی راش و ممرز در افزایش تنوع پرندگان تأثیر بسزایی دارند. Behroozirad *et al.* (2011) به بررسی روند تغییرات ماهانه تنوع و تراکم و جمعیت پرندگان آبزی تالاب هورالعظیم پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تالاب هورالعظیم، جهت حفاظت نسل پرندگان بومی و مهاجر، بسیار با اهمیت است. Hemami & Zaeri Amirani (2011) به بررسی تأثیر اندازه و شکل پارک‌های شهری بر غنای گونه‌ای پرندگان پرداخته و بیان داشتند که شلوغی پارک‌ها از غنای گونه‌ای پرندگان می‌کاهد.

مواد و روش‌ها

منطقه مورد مطالعه

منطقه حفاظت شده پرور با مساحتی برابر با ۶۴۵۶۳ هکتار از سال ۱۳۴۶ تحت حفاظت قرار گرفت. پرور منطقه‌ای است کوهستانی، دشتی، جنگلی و تپه ماهوری در استان سمنان. این منطقه دارای مرز مشترک با پناهگاه حیات وحش دودانگه و منطقه

$$R_{mg} = \frac{S-1}{\ln(N)} \quad \text{مارگالف}$$

شاخص‌های تنوع گونه‌ای) Meshkini *et al.*, (2014; Ejtehadi *et al.*, 2008 :

$$1 - \hat{D} = 1 - \sum_{i=1}^s \left[\frac{n_i(n_i - 1)}{N(N - 1)} \right] \quad \text{سمپسون}$$

$$H' = \sum_{i=1}^s (P_i) (\log_2 P_i) \quad \text{شنون-وینر}$$

$$H' = - \sum_{i=1}^s P_i \ln(P_i) \quad \text{شنون}$$

$$Hg = \frac{1}{N} \log \left(\frac{N!}{n_1! n_2! n_3! \dots} \right) \quad \text{بریلئون}$$


شاخص یکنواختی گونه‌ای) Meshkini *et al.*, (2014; Ejtehadi *et al.*, 2008 :

$$V' = \frac{D}{D_{max}} \quad \text{سیمپسون}$$

که در تمامی سفرها استفاده شد. به این صورت که در یک برگ A4 تمامی اطلاعات مورد نیاز به صورت یک جدول طراحی گردید. از مزایای استفاده از این روش کسب و ثبت اطلاعات مورد نیاز و ضروری، جلوگیری از فراموش کاری‌ها و موازی کاری است. (۴) مصاحبه با محیط‌بانان. در بسیاری از موقع محيط‌بانان یا محل مشاهده بسیاری از گونه‌های با ارزش را می‌دانستند و یا پس از آموزش و شناسایی پرنده‌ای، در تعیین نقاط حضور قطعی یا احتمالی گونه، راهنمایی‌های بسیار مؤثری می‌داشتند.

شاخص‌های غنای گونه‌ای) Meshkini *et al.*, (2014; Ejtehadi *et al.*, 2008 :

$$R_{mn} = x = \frac{S}{\sqrt{N}} \quad \text{منهینگ}$$




نقشه ۱. منطقه مورد مطالعه


شکاری نیز با سهم ۱۲ درصدی، تعداد ۱۸ گونه را شامل می‌شوند. سهم گونه‌های شناسایی شده در راسته‌های مختلف در شکل ۱ نشان داده شده است. بیشترین تعداد گونه نیز مربوط به فصل تابستان به تعداد ۲۰۶۳ عدد پرندگان است (شکل ۲). از تعداد گونه‌های شناسایی شده ۴۷ گونه، بومی (مقیم) تمام سال منطقه هستند و احتمالاً زادآوری دارند، ۲۱ گونه دیگر فقط در فصل زادآوری در منطقه دیده می‌شوند، ۱۸ گونه زمستان‌گذران و سایر گونه‌ها عبوری منطقه هستند.

نتایج

نتایج شناسایی پرنده‌گان منطقه حفاظت شده پرور سمنان در یک دوره یکساله در جدول ۱ نشان داده شده است. در طی این بررسی تعداد ۷۲۲۴ عدد پرندگان از ۱۶۱ گونه، ۳۷ خانواده و ۱۳ راسته شناسایی شده است. بیشترین تعداد گونه مربوط به فصل تابستان با تعداد ۹۵ گونه و پس از آن به ترتیب فصول بهار با ۹۲ گونه، پاییز ۸۸ گونه و زمستان ۴۵ گونه قرار دارند. بیشک گنجشک‌سانان با سهم ۶۸ درصدی بیشترین غنای گونه‌ای را با تعداد ۱۰۱ گونه داشته‌اند. پرنده‌گان



شکل ۱. نسبت گونه‌های شناسایی شده در راسته‌های مختلف



شکل ۲. فراوانی گونه‌های مشاهده شده در فصول مختلف سال در پرور


نتایج شاخص‌های هتروژنیتی (ناهمگنی)

سه شاخص نتایج متفاوت را ارائه می‌کند به شکلی که در نمایه سیمپسون تابستان و در نمایه شنون پاییز بیشترین ناهمگنی را دارد. در هر دو نمایه‌ها زمستان کمترین ناهمگنی را دارد. نمایه بریلوئن اختلاف معنی‌داری را برای ۴ فصل قائل نیست (شکل C).

(شکل C).

نتایج شاخص‌های یکنواختی گونه‌ای


براساس نمایه سیمپسون زمستان از بیشترین یکنواختی برخوردار بوده و کمترین یکنواختی مربوط به بهار است. نمایه اسمیت- ولیسون پاییز را متنوع‌ترین فصل معرفی کرده است و براساس این نمایه زمستان کمترین یکنواختی را دارد (شکل D).



شاخص‌های تنوع زیستی

نتایج شاخص‌های غنای گونه‌ای براساس دو شاخص مارگالوف و منهینگ، فصل پاییز از بیشترین غنا و پس از آن تابستان قرار دارد. کمترین غنای گونه‌ای با یک فاصله فصل زمستان است (شکل ۳A).

نتایج شاخص‌های تنوع گونه‌ای براساس دو نمایه شنون- ولینر و سیمپسون بیشترین تنوع را فصل تابستان، سپس بهار و کمترین تنوع متعلق به زمستان است. اما دو نمایه شنون و بریلوئن نتایج مختلفی را نشان داده‌اند و براساس این دو نمایه بیشترین تنوع مربوط به پاییز بوده و تابستان در جایگاه بعدی قرار دارد (شکل ۳B).



شکل ۳. نمودارهای شاخص‌های تنوع زیستی و نتایج آنها. (A) نمایانگر شاخص‌های غنای گونه‌ای در چهارفصل، (B) نتایج شاخص‌های تنوع گونه‌ای در چهارفصل، (C) نتایج شاخص‌های هتروژنیتی (ناهمگنی) گونه‌ای در چهارفصل، (D) نتایج شاخص‌های یکنواختی گونه‌ای در چهارفصل.

مریبوط به فهرست گونه‌ها، غنای گونه‌ای پرندگان شکاری که در منطقه شناسایی شده‌اند به نسبت بالا بوده و این امر گویای سلامت اکوسیستم می‌باشد. همچنین بسیاری از گونه‌هایی که مشاهده شده‌اند نابالغ بوده و اغلب این گونه‌ها تا پایان فصل تابستان در منطقه حضور داشتند. لذا به نظر می‌رسد که بسیاری از گونه‌ها به‌ویژه گونه‌های شاخه‌نشین و گنجشک‌سانان بومی یا مهاجر زادآور منطقه می‌باشند. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که این منطقه اولاً، یک منطقه منبع (به جهت زادآور بودن) برای بسیاری از گونه‌های پرندگان می‌باشد. ثانیاً، اهمیت حفاظت منطقه و تأثیر ارزش بالای حفاظتی برای سایر زیستگاه‌های کشور دارد. به لحاظ شرایط زیستگاهی به‌ویژه گیاهان موجود در منطقه، شرایط اقلیمی منطقه موجب گردیده که منطقه توان بالایی برای تامین نیازهای گونه‌ها داشته باشد.

شناسایی ۱۳ گونه سه‌ره (Fringillidae)، ۶ گونه زردپره (Emberizidae)، هر سه گونه کمرکولی (Sittidae) ۶ گونه چرخ‌ریسک (Paridae)، ۱۲ گونه سسک (Sylviidae) و ۲۶ گونه از خانواده توکاها (Turdidae) که در ایران زیست می‌کنند، بخش‌هایی از غنای بالای گونه‌ای منطقه است.

به‌منظور شناخت و ارزیابی روند تغییرات اکوسیستم از سری شاخص‌های تنوع زیستی استفاده شد (Karimi *et al.*, 2012). از این شاخص‌ها برای ارزیابی سه جنبه از ساختار جامعه استفاده می‌شود: غنای گونه‌ای که بیانگر حضور انواع گونه‌هاست. یکنواختی گونه‌ای که نحوه پراکنش و توزیع جمعیت افراد گونه‌هاست. تنوع گونه‌ای که دو مقدار غنا و یکنواختی را در یک کمیت جمع می‌کند. هرچه میزان تنوع گونه‌ای بالاتر باشد به این معناست که شاخص غلبه که بیانگر فراوانی بالاتر برخی گونه‌ها نسبت به سایر گونه‌هاست پایین‌تر است و گونه‌ها از توزیع یکنواخت‌تری برخوردارند (Barnes, 1998; Karimi, 1999; Mesdaghi, 2012). در ارتباط با شاخص‌های تنوع گونه‌ای (et al., 2012).

بحث و نتیجه‌گیری

در این مطالعه به بررسی تنوع پرندگان منطقه حفاظت‌شده پرور سمنان در طول یک دوره یک ساله پرداخته شد. استفاده از اطلاعات شناسایی و سرشماری پرندگان می‌تواند پایه و اساسی برای برنامه‌های حفاظت از تنوع زیستی اکوسیستم‌ها باشد (Safariyan *et al.*, 2014). منطقه حفاظت‌شده پرور سمنان به‌دلیل تنوع بالای آب و هوایی، دارای نواحی جنگلی، بیشه‌زار و دشت‌های نسبتاً وسیع می‌باشد. شمال این منطقه منتهی‌الیه جنوبی استان مازندران و جنوب آن به دامنه‌های شمالی سمنان می‌رسد. تنوع آب و هوایی تنوع گونه‌های پرندگان را موجب شده است. با وجودی که این منطقه هیچ‌گونه آب‌بندان طبیعی و مصنوعی را در خود ندارد تعداد ۱۶۱ گونه از ۱۳ راسته، یعنی حدود ۳۰ درصد پرندگان ایران، در این منطقه در وسعتی بسیار کمتر از این نسبت شناسایی شده است. این تنوع بالا را می‌توان حاصل تنوع زیستگاهی موجود در منطقه دانست.

طی مطالعه حاضر نتایج حاصل از بررسی فون پرندگان منطقه پرور نشان داد که تنوع بالایی از پرندگان به‌خصوص در بهار، تابستان و پاییز در این منطقه زیست می‌کند. در ارتباط با فون پرندگان آبزی و کنار آبزی باید گفت که فقدان پیکره آبی طبیعی یا انسان ساخت سبب شده تنوع بسیار اندکی از پرندگان آبزی و کنار آبزی در منطقه شناسایی شوند (Yosefi et al., 2015). لذا غنای پرندگان در زمستان بسیار کمتر از سایر فصوص بوده است.

در ارتباط با اهمیت بخش خاصی از منطقه به‌عنوان یک لکه داغ پرندگان نگری باید گفت که نکته قابل توجه در ارتباط با این زیستگاه آن است که پراکندگی پرندگان از یکپارچگی خوبی در کل منطقه برخوردار بوده است. این امر نشان از یک پایداری و سلامت در تمامی اکوسیستم است (Mesdaghi, 1999).

براساس بازدیدهای به‌عمل‌آمده و جدول‌های

بهویژه غنای گونه‌ای معرفی می‌شود (Doyon *et al.*, 2005). تنوع و ساختار گونه‌های گیاهی بر پراکنش و غنای پرندگان اثرگذار است (Williams, 1996).

از بین گونه‌های شناسایی شده دو گونه عقاب شاهی (Falco cherrug) و بالابان (Aquila heliaca) در فهرست قرمز با وضعیت آسیب‌پذیر (VU) هستند. اما از نظر فهرست ملی گونه‌های تهدیدشده ایران تعداد هشت گونه از پرندگان شناسایی شده در معرض خطر انقراض هستند.

بخش رودبارک از بکترین زیستگاه‌های منطقه برای حیات وحش می‌باشد که بدون توجه به امر اولویت حفاظتی توسعه محدوده اکوتوریستی در حال اجرا می‌باشد.

تعدد جاده‌ها و عبور آنها از دل منطقه، احداث و افزایش ساخت و سازهای بهویژه توریستی بدون مکان‌سنجی مناسب، عدم نظارت مناسب و کمبود نیرو برای نظارت ورود و خروج منطقه، عدم نظارت بر قطع درختان و تخریب پوشش گیاهی موجب شده که منطقه سرعت تخریب بالایی داشته باشد.

سپاسگزاری

از جناب آقای مهدی مجتبه‌دی، حسین ورجاوند و سرکار خانم المیرا شعریافی که در بازدیدهای میدانی همراهی کردند، تشکر و قدردانی می‌گردد.

نتایج نشان داد که به ترتیب سه فصل پاییز، تابستان و بهار از وضعیت خوبی (تنوع بالا) برخوردار هستند. طبق نتایج به دست آمده هرچه به سمت فصل زمستان پیش می‌رویم مقادیر شاخص‌های تنوع کاهش قابل توجهی می‌یابند. به نظر می‌رسد رابطه‌ای بین تراکم پوشش گیاهی و سرما از یک سو و فراوانی، تنوع و ترکیب پرندگان منطقه وجود داشته باشد (Karimi *et al.*, 2012). افزایش ارتفاع در منطقه و حرکت به سمت مناطق شمالی‌تر به‌طور قابل توجهی باعث شکل‌گیری توده‌های جنگلی بالغ می‌شود. پراکندگی پرندگان وابسته به چنین ساختارهای جنگلی مانند دارکوب و کمرکولی جنگلی و پرندگان شاخه‌نشین بیشتر از مناطق جنوبی‌تر بوده است. این مناطق که از اشکوبهای بیشتری برخوردار بودند، در نتیجه خردزیستگاه (ریزبوم) بیشتری در آنها شکل گرفته است که در نتیجه تنوع پرندگان در آنها بالاتر است (Askari *et al.*, 2010). تنوع بالاتر ساختار پوشش گیاهی موجب افزایش چرخه مواد غذایی و تنوع بیشتر Khera *et al.*, 2009) پناه مورد نیاز برای گونه‌ها می‌شود (همچنین این مناطق از امنیت بالاتری نسبت به مناطق با دخالت انسانی برخوردار هستند (Ghadiry Khanaposhtani, 2010). از این رو ساختار جنگلی و پوشش گیاهی به عنوان مهمترین عامل تعیین‌کننده بر خصوصیات جامعه پرندگان

پیوست ۱. فهرست پرندگان شناسایی شده به همراه وضعیت ملی و بین‌المللی آنها

CITES	Red list	نیازمندی برای تجزیه	زمستان	پاییز	تابستان	بهار	English name	Scientific name	نام فارسی	ردی:
خ.-	-	Lc	*				Teal	<i>Anas crecca</i>	خوتکا	۱
خ.-	II	Lc	*	*	*	*	Lammergeier	<i>Gypaetus barbatus</i>	هما	۲
خ.-	II	Lc			*	*	Griffon Vulture	<i>Gyps fulvus</i>	دال	۳
خ.-	II	Lc		*			Short-toed Eagle	<i>Circaetus gallicus</i>	عقاب مارخور	۴
خ.-	II	Lc		*	*	*	Hen Harrier	<i>Circus cyaneus</i>	ستقر خاکستری	۵
خ.-	II	Nt		*			Pallid Harrier	<i>Circus macrourus</i>	ستقر سفید	۶
خ.-	II	Lc	*	*	*	*	Levant Sparrowhawk	<i>Accipiter brevipes</i>	پیغو	۷
خ.-	II	Lc		*			Goshawk	<i>Accipiter gentilis</i>	طرلان	۸
خ.-	II	Lc		*	*	*	Sparrowhawk	<i>Accipiter nisus</i>	قرقی	۹
خ.-	II	Lc		*			Common Buzzard	<i>Buteo buteo</i>	سارگپه معمولی	۱۰

ادامه پیوست ۱. فهرست پرندگان شناسایی شده به همراه وضعیت ملی و بین‌المللی آنها

CITES	Red list	نوع بین‌المللی	زمستان	پاییز	تابستان	بهار	English name	Scientific name	نام فارسی	ردیف
خ.	II	Lc	*	*	*	*	Long-legged Buzzard	<i>Buteo rufinus</i>	سارگه پابلند	۱۱
خ.	II	Lc		*			Rough-legged Buzzard	<i>Buteo lagopus</i>	سارگه پربا	۱۲
خ.	II	Lc		*			Lesser Spotted Eagle	<i>Aquila pomarina</i>	عقاب جنگلی	۱۳
خ.	I	Vu		*			Imperial Eagle	<i>Aquila heliaca</i>	عقاب شاهی	۱۴
خ.	II	Lc	*	*	*	*	Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>	عقاب استی	۱۵
خ.	II	Lc	*	*	*	*	Golden Eagle	<i>Aquila chrysaetos</i>	عقاب طلایی	۱۶
خ.	II	Lc	*	*	*	*	Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	دیچه	۱۷
خ.	II	Lc	*	*	*	*	Imperial Eagle	<i>Aquila heliaca</i>	لیل	۱۸
خ.	II	Vu	*				Saker Falcon	<i>Falco cherrug</i>	بالابان	۱۹
خ.	I	Lc				*	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	بحری	۲۰
خ.	I	Lc				*	Barbary Falcon	<i>Falco pelegrinoides</i>	شاهین	۲۱
خ.	I	Lc				*	Caspian Snowcock	<i>Tetraogallus caspius</i>	کبک دری	۲۲
خ.	-	Lc				*	Pheasant	<i>Phasianus colchicus</i>	قرقاول	۲۳
غ.	-	Lc	*	*	*	*	Chukar	<i>Alectoris chukar</i>	کبک	۲۴
غ.	-	Lc		*		*	See-see Partridge	<i>Ammoperdix griseogularis</i>	تبهو	۲۵
غ.	-	Lc	*	*	*	*	Quail	<i>Coturnix coturnix</i>	بلدچین	۲۶
خ.	I	Lc			*		Houbara Bustard	<i>Chlamydotis undulata</i>	هوبره	۲۷
غ.	-	Lc		*			Woodcock	<i>Scolopax rusticola</i>	ایما	۲۸
غ.	-	Lc		*			Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>	آچلیک تک زی	۲۹
غ.	-	Lc			*		Black-bellied Sandgrouse	<i>Pterocles orientalis</i>	باقرقره شکم سیاه	۳۰
غ.	-	Lc			*		Pin-tailed Sandgrouse	<i>Pterocles alchata</i>	باقرقره شکم سفید	۳۱
غ.	III	Lc	*	*	*	*	Rock Dove	<i>Columba livia</i>	کبوتر چاهی	۳۲
غ.	-	Lc			*		Stock Dove	<i>Columba oenas</i>	فاخته	۳۳
غ.	-	Lc	*	*	*	*	Wood Pigeon	<i>Columba palumbus</i>	کبوتر جنگلی	۳۴
غ.	-	Lc		*		*	Turtle Dove	<i>Streptopelia tutur</i>	قمری معمولی	۳۵
غ.	-	Lc		*		*	Laughing Dove	<i>Streptopelia senegalensis</i>	قمری خانگی	۳۶
غ.	-	Lc		*		*	Common Cuckoo	<i>Cuculus canorus</i>	کوکوی معمولی	۳۷
خ.	I	Lc		*		*	European Scops Owl	<i>Otus scops</i>	مرغ حق	۳۸
خ.	II	Lc		*		*	Tawny Owl	<i>Strix aluco</i>	جند جنگلی	۳۹
خ.	II	Lc		*		*	Eagle Owl	<i>Bubo bubo</i>	شاه بوف	۴۰
خ.	II	Lc	*	*	*	*	Little Owl	<i>Athene noctua</i>	جند کوچک	۴۱
غ.	-	Lc	*	*	*	*	European Nightjar	<i>Caprimulgus europaeus</i>	شبگرد	۴۲
غ.	-	Lc		*		*	Common Swift	<i>Apus apus</i>	بادخورک	۴۳
غ.	-	Lc	*				Alpine Swift	<i>Tachymarpitis melba</i>	پرسنی کوهی	۴۴
غ.	-	Lc		*		*	Blue-cheeked Bee-eater	<i>Merops persicus</i>	زنبورخوار گلخوارمایی	۴۵
غ.	-	Lc		*		*	European Bee-eater	<i>Merops apiaster</i>	زنبور خوار (معمولی)	۴۶
غ.	-	Nt		*		*	European Roller	<i>Coracias garrulus</i>	سبز قبا	۴۷
غ.	-	Lc		*		*	Hoopoe	<i>Upupa epops</i>	هدهد	۴۸
غ.	-	Lc		*		*	Green Woodpecker	<i>Picus viridis</i>	دارکوب سبز	۴۹
غ.	-	Lc	*	*	*	*	Great Spotted Woodpecker	<i>Picoides major</i>	دارکوب خالدار بزرگ	۵۰
غ.	-	Lc	*	*	*	*	Syrian Woodpecker	<i>Picoides syriacus</i>	دارکوب باغی	۵۱
غ.	-	Lc		*		*	Black Woodpecker	<i>Dryocopus martius</i>	دارکوب سیاه	۵۲
غ.	-	Lc	*	*	*	*	Short-toed Lark	<i>Calandrella brachydactyla</i>	چکاوک پنجه کوتاه	۵۳
غ.	-	Lc		*		*	Calandra Lark	<i>Melanocorypha calandra</i>	چکاوک گندم زار	۵۴
غ.	-	Lc	*				Desert Lark	<i>Ammomanes deserti</i>	چکاوک سسگلاخ	۵۵
غ.	-	Lc				*	Bimaculated Lark	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	چکاوک طوقی	۵۶
غ.	-	Lc	*	*	*	*	Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>	چکاوک کاکلی	۵۷
غ.	-	Lc	*	*	*	*	Sky Lark	<i>Alauda arvensis</i>	چکاوک آسمانی	۵۸
غ.	-	Lc		*			Wood Lark	<i>Lullula arborea</i>	چکاوک درختی	۵۹
غ.	-	Lc	*	*	*	*	Shore Lark	<i>Eremophila alpestris</i>	چکاوک شاخدار	۶۰

ادامه پیوست ۱. فهرست پرنده‌گان شناسایی شده به همراه وضعیت ملی و بین‌المللی آنها

CITES	Red list	قیمتی پُر	زمستان	پاییز	تابستان	بهار	English name	Scientific name	نام فارسی	ردی
خ	-	Lc	*			*	House Martin	<i>Delichon urbica</i>	چچله دمگاه سفید	۶۱
خ	-	Lc		*	*	*	Crag Martin	<i>Hirundo rupestris</i>	چچله کوهی	۶۲
خ	-	Lc			*	*	Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>	چچله رودخانه‌ای	۶۳
خ	-	Lc	*	*	*	*	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	پرستو	۶۴
خ	-	Lc	*				Tawny Pipit	<i>Anthus campestris</i>	پیپت دشتی	۶۵
خ	-	Lc	*	*	*		Tree Pipit	<i>Anthus trivialis</i>	پیپت درختی	۶۶
خ	-	Lc	*			*	Water Pipit	<i>Anthus spinoletta</i>	پیپت تالایی	۶۷
خ	-	Lc	*			*	Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>	دم جنابک معمولی	۶۸
خ	-	Lc	*			*	Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>	دم جنابک خاکستری	۶۹
خ	-	Lc	*	*	*	*	White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>	دم جنابک ابلق	۷۰
خ	-	Lc			*	*	Dipper	<i>Cinclus cinclus</i>	زیرآبروک	۷۱
خ	-	Lc	*				Wren	<i>Troglodytes troglodytes</i>	الیکایی	۷۲
خ	-	Lc	*				Dunnock	<i>Prunella modularis</i>	صعوه باغی	۷۳
خ	-	Lc	*				Radde's Accentor	<i>Prunella ocularis</i>	صعوه ابرو سفید	۷۴
خ	-	Lc	*				Alpine Accentor	<i>Prunella collaris</i>	صعوه کوهی	۷۵
خ	-	Lc	*				Rusfous Bush Robin	<i>Cercotrichas galactotes</i>	دم چتری	۷۶
خ	-	Lc			*		Robin	<i>Erithacus rubecula</i>	سینه سرخ	۷۷
خ	-	Lc	*				Nightingale	<i>Luscinia megarhynchos</i>	بلبل	۷۸
خ	-	Lc				*	Whie-throated Robin	<i>Irania gutturalis</i>	سینه سرخ ایرانی	۷۹
خ	-	Lc	*				Eversmann's Redstart	<i>Phoenicurus erythronotus</i>	دم سرخ پشت بلوطی	۸۰
خ	-	Lc			*		Black Redstart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	دم سرخ سیاه	۸۱
خ	-	Lc	*	*			Common Redstart	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	دم سرخ (معمولی)	۸۲
خ	-	Lc	*				Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>	چک بوته‌ای	۸۳
خ	-	Lc	*				Stonechat	<i>Saxicola torquata</i>	چک	۸۴
خ	-	Lc	*	*			Isabelline Wheatear	<i>Oenanthe isabellina</i>	چکچک دشتی	۸۵
خ	-	Lc	*				Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>	چکچک کوهی	۸۶
خ	-	Lc	*				Black-eared Wheatear	<i>Oenanthe hispanica</i>	چکچک گوش سیاه	۸۷
خ	-	Lc			*		Desert Wheatear	<i>Oenanthe deserti</i>	چکچک بیابانی	۸۸
خ	-	Lc	*	*			Finsche's Wheatear	<i>Oenanthe finschii</i>	چکچک پشت سفید	۸۹
خ	-	Lc	*	*			Red-tailed Wheatear	<i>Oenanthe xanthoprymnna</i>	چکچک دم سرخ	۹۰
خ	-	Lc	*				Hume's Wheatear	<i>Oenanthe albioniger</i>	چکچک سر سیاه	۹۱
خ	-	Lc			*		Oenanthe pleschanka	<i>Pied Wheatear</i>	چکچک ابلق	۹۲
خ	-	Lc			*		Oenanthe picata	<i>Eastern Pied Wheatear</i>	چکچک ابلق خاوری	۹۳
خ	-	Lc	*	*			Rock Thrush	<i>Monticola saxatilis</i>	طرقه کوهی	۹۴
خ	-	Lc			*		Blue Rock Thrush	<i>Monticola solitarius</i>	طرقه کبود (آبی)	۹۵
خ	-	Lc	*	*	*		Blackbird	<i>Turdus merula</i>	توکا (توکای سیاه)	۹۶
خ	-	Lc	*			*	Ring Ouzel	<i>Turdus torquatus</i>	توکای طوقی	۹۷
خ	-	Lc	*				Black-throated Thrush	<i>Turdus ruficollis</i>	توکای گلوسیاه	۹۸
خ	-	Lc	*			*	Redwing	<i>Turdus iliacus</i>	توکای بال سرخ	۹۹
خ	-	Lc	*	*	*	*	Mistle Thrush	<i>Turdus viscivorus</i>	توکای بزرگ	۱۰۰
خ	-	Lc	*	*	*	*	Song Thrush	<i>Turdus philomelos</i>	توکای باغی	۱۰۱
خ	-	Lc	*	*	*		Olivaceous Warbler	<i>Hippolais pallida</i>	سیسک درختی زیتونی	۱۰۲
خ	-	Lc	*				Booted Warbler	<i>Hippolais caligata</i>	سیسک درختی کوچک	۱۰۳
خ	-	Lc	*	*			Icterine Warbler	<i>Hippolais icterina</i>	سیسک درختی زرد	۱۰۴
خ	-	Lc	*	*			Scrub Warbler	<i>Scotocerca inquieta</i>	سیسک جناب	۱۰۵
خ	-	Lc					Graceful Prinia	<i>Prinia gracilis</i>	سیسک شکیل	۱۰۶
خ	-	Lc			*		Barred Warbler	<i>Sylvia nisoria</i>	سیسک چشم سفید	۱۰۷
خ	-	Lc			*		Lesser Whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>	سیسک گونه سیاه	۱۰۸
خ	-	Lc	*	*			Whitethroat	<i>Sylvia communis</i>	سیسک گلو سفید	۱۰۹
خ	-	Lc			*	*	Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>	سیسک سر سیاه	۱۱۰
خ	-	Lc	*	*			Green Warbler	<i>Phylloscopus nitidus</i>	سیسک بیدی سبز	۱۱۱
خ	-	Lc			*		Greenish Warbler	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	سیسک سبز	۱۱۲

ادامه پیوست ۱. فهرست پرندگان شناسایی شده به همراه وضعیت ملی و بین‌المللی آنها

CITES	Red list	نیزه‌بندی نمود	زمستان	پاییز	تابستان	بهار	English name	Scientific name	نام فارسی	ردیف
غ.ج.	-	Lc	*	*	*	*	Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybitus</i>	سیسک چفچاف	۱۱۳
غ.ج.	-	Lc			*		Red-breasted Flycatcher	<i>Ficedula parva</i>	مگس گیر سینه سرخ	۱۱۴
غ.ج.	-	Lc			*	*	Spotted Flycatcher	<i>Muscicapa striata</i>	مگس گیر خالدار	۱۱۵
غ.ج.	-	Lc		*			Long-tailed Tit	<i>Aegithalos caudatus</i>	چخر ریسک دم دراز	۱۱۶
غ.ج.	-	Lc	*	*	*	*	Sombre Tit	<i>Parus lugubris</i>	چخر ریسک سر سیاه	۱۱۷
غ.ج.	-	Lc	*	*	*	*	Great Tit	<i>Parus major</i>	چخر ریسک بزرگ	۱۱۸
غ.ج.	-	Lc	*	*	*	*	Coal Tit	<i>Parus ater</i>	چخر ریسک پس سرسفید	۱۱۹
غ.ج.	-	Lc	*	*	*	*	Blue Tit	<i>Parus caeruleus</i>	چخر ریسک سرآبی	۱۲۰
-	-	-			*		Caspian Tit	<i>Poecile hyrcanus</i>	چخر ریسک پشت بلوطی	۱۲۱
غ.ج.	-	Lc		*	*	*	Eastern Rock Nuthatch	<i>Sitta tephronota</i>	کمر کولی بزرگ	۱۲۲
غ.ج.	-	Lc	*	*	*	*	Western Rock Nuthatch	<i>Sitta neumayer</i>	کمر کولی کوچک	۱۲۳
غ.ج.	-	Lc	*			*	Nuthatch	<i>Sitta europaea</i>	کمر کولی جنگلی	۱۲۴
غ.ج.	-	Lc			*		Wallcreeper	<i>Tichodroma muraria</i>	دیوار خرک	۱۲۵
غ.ج.	-	Lc			*		Golden Oriol	<i>Oriolus oriolus</i>	پری شاهrix	۱۲۶
غ.ج.	-	Lc			*		Red-backed Shrike	<i>Lanius collurio</i>	سنگ چشم پشت سرخ	۱۲۷
غ.ج.	-	Lc			*		Isabelline Shrike	<i>Lanius isabellinus</i>	سنگ چشم خاکستری	۱۲۸
غ.ج.	-	Lc	*	*	*		Lesser Grey Shrike	<i>Lanius minor</i>	کوچک	۱۲۹
غ.ج.	-	Lc			*		Great Grey Shrike	<i>Lanius excubitor</i>	سنگ چشم بزرگ	۱۳۰
غ.ج.	-	Lc	*	*	*	*	Jay	<i>Garrulus glandarius</i>	جي جانق	۱۳۱
غ.ج.	-	Lc	*	*	*	*	Magpie	<i>Pica pica</i>	زاغی	۱۳۲
ز.ز.	-	Lc	*				Rook	<i>Corvus frugilegus</i>	کلاخ سیاه	۱۳۳
غ.ج.	-	Lc	*	*	*	*	Chough	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	کلاخ کوهی نوک سرخ	۱۳۴
ز.ز.	-	Lc	*	*	*	*	Hooded Crow	<i>Corvus corone</i>	کلاخ ابلق	۱۳۵
غ.ج.	-	Lc	*	*	*	*	Raven	<i>Corvus corax</i>	غراب	۱۳۶
غ.ج.	-	Lc	*				Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>	سار	۱۳۷
ح.	-	Lc	*				Rose-coloured Starling	<i>Sturnus roseus</i>	سار صورتی	۱۳۸
ز.ز.	-	Lc	*	*	*	*	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	گنجشک خانگی	۱۳۹
ز.ز.	-	Lc	*	*	*	*	Tree Sparrow	<i>Passer montanus</i>	گنجشک درختی	۱۴۰
ز.ز.	-	Lc					Spanish Sparrow	<i>Passer hispaniolensis</i>	گنجشک سینه سیاه	۱۴۱
ز.ز.	-	Lc			*	*	Rock Sparrow	<i>Petronia petronia</i>	گنجشک کوهی	۱۴۲
غ.ج.	-	Lc	*	*	*	*	Chaffinch	<i>Fringilla coelebs</i>	سهره چنگلی	۱۴۳
غ.ج.	-	Lc			*		Trumpeter Finch	<i>Rhodopechys githaginea</i>	سهره صورتی	۱۴۴
غ.ج.	-	Lc			*		Common Rosefinch	<i>Carpodacus erythrinus</i>	سهره گلی	۱۴۵
غ.ج.	-	Lc	*	*	*	*	White-winged Grosbeak	<i>Mycerobas carnipes</i>	سهره سیاه	۱۴۶
غ.ج.	-	Lc			*		Red-fronted Serin	<i>Serinus pusillus</i>	سهره پیشانی سرخ	۱۴۷
غ.ج.	-	Lc	*	*	*	*	Goldfinch	<i>Carduelis carduelis</i>	سهره طلایی	۱۴۸
غ.ج.	-	Lc			*		Greenfinch	<i>Carduelis chloris</i>	سهره سبز	۱۴۹
غ.ج.	-	Lc	*				Siskin	<i>Carduelis spinus</i>	سهره زرد	۱۵۰
غ.ج.	-	Lc					Crimson-winged Finch	<i>Rhodopechys sanguinea</i>	سهره بال سرخ	۱۵۱
غ.ج.	-	Lc			*		Trumpeter Finch	<i>Rhodopechys githaginea</i>	سهره صورتی	۱۵۲
غ.ج.	-	Lc			*		Linnet	<i>Carduelis cannabina</i>	سهره سینه سرخ	۱۵۳
غ.ج.	-	Lc			*		Desert Finch	<i>Rhodopechys obsolete</i>	سهره خاکی	۱۵۴
غ.ج.	-	Lc			*		Hawfinch	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	سهره نوک بزرگ	۱۵۵
غ.ج.	-	Lc			*		Ortolan Bunting	<i>Emberiza hortulana</i>	زرد پره سرزنتونی	۱۵۶
غ.ج.	-	Lc			*		Yellowhammer	<i>Emberiza citronella</i>	زردپره سرخ	۱۵۷
غ.ج.	-	Lc	*	*	*	*	Rock Bunting	<i>Emberiza cia</i>	زردپره کوهی	۱۵۸
غ.ج.	-	Lc			*		Grey-necked Bunting	<i>Emberiza buchanani</i>	زردپره سرخاکستری	۱۵۹
غ.ج.	-	Lc			*		Black-headed Bunting	<i>Emberiza melanocephala</i>	زردپره سر سیاه	۱۶۰
غ.ج.	-	Lc	*				Corn Bunting	<i>Miliaria calandra</i>	زردپره مزرعه	۱۶۱

خ.ا: در معرض خطر انقرض غ.ج: غیر حمایت شده ح: حمایت شده و حفاظت شده ز: زیبایار

REFERENCES

- Askari, R.; Behrouzirad, B.; Khalilipour, O.; Yahaghi, A. (2010). Survey of biodiversity indicators changes of birds on Ahwaz green spaces. *J. Animal Environment*; 2: 41-56. (in Persian)
- Behrozirad, B. (2016). Evaluating the effect of reducing water of Urmia Lake on the society and species diversity of water birds in Kaniborazan wetland during 1995, 2005 and 2015. *Environment Research*; 7(14); 59-70. (in Persian)
- Behrozirad, B.; Rasekh, A.R.; Eshraghian, N.; Mola, S.A.; Amini, A. (2011). Evaluating monthly changes of diversity and abundance of Hoor Alzim wetland water birds population. *Environment Science and Research*; 13:3. (in Persian)
- Barnes, B.V.; Pregitzer, K.S.; Spies, T.A. (1998). Ecological forest site classification. *J. Forest*; 80: 493-498.
- CITES (2008). Checklist of CITES species.
- Darvishsefat, A.A. (2006). Atlas of Iranian protected area. University of Tehran. (in Persian)
- Doyon, F.; Gagnon, D.; Giroux, J. F. (2005). Effects of strip and single-tree selection cutting on birds and their habitat in a southwestern Quebec northern hardwood forest. *Forest Ecology and Management*; 209: 101-115.
- Ejtehadi, H.; Sepehri, A.; Akkafi, H. (2008). Methods of Measuring Biodiversity. University of Ferdosi; p. 228. (in Persian)
- Ghadiry Khanaposhtani, M. (2010). Comparison of logged and unlogged forest patch on avifaunal diversity in northern Alborz: A case study of Kheirud Forest. M.Sc. thesis. Tehran University; 113p. (in Persian)
- Hemami, M.R.; Zaeri Amirani, A. (2011). Study on the effect of the size and shape of urban parks on bird's species richness (case study: Esfahan parks). *Journal of Environmental Studies*; 37(59): 55-62. (in Persian)
- IUCN. (2008). Red List; www.iucn.org
- (accessed on 2010).
- Karimi, S.; Varasteh Moradi, H.; Ghadimi, M. (2012). Study on differences in biodiversity indices of bird community at different vegetation types in Shast-Kalate forest, Gorgan. *Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources*; 1(1), 1-18. (in Persian)
- Khani, A.; Kaboli, M.; Yoosefi, M.; Sheykhi Yeylanloo, S.; Noorani, E.; Karami, M. (2014). Species richness and biological status of Sarakhs birds in North east of Iran. *Animal Biology*; 7: 1. (in Persian)
- Krebs, J.Ch. (2001). *Ecological Methodology*, Published by Harper & Row publishers, London. Pp.93- 370.
- Khera, N.; Mehta, V.; Sabata, B.C. (2009). Interrelationship of birds and habitat features in urban green spaces in Delhi, India. *Urban Forestry & Urban Greening*; 8: 187-196.
- Mansouri, J. (2008). A guid to the Bird of Iran. 2nd ed., Tehran, Farzaneh book publication; 513. (in Persian)
- Mesdaghi, M. (1999). Study of species richness and vegetative forms under three levels of exploitation in east Golestan Province ranges. *Journal of Agriculture and Natural Resources*; 6(1): 55-62. (in Persian)
- Meshkin, A.; Behrozirad, B.; Saffarian, Sh.; Karimpoor Dasht Bozorg, A. (2014). Investigation of diversity and density of water birds & wader in order to manage Sanye Foolad Wetland as birds' habitat; *Scientific Research Journal of Animal Environment*; 6(2). (in Persian)
- Mori, Y.N.; Sodhi, S.; Kawanishi, S.; Amagishi, S.Y. (2001). The effect of human disturbances and flock composition on the flight distances of water flow species. *Journal of Ethology*; Volume 19, pp: 115-119.
- Porter, R.; Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East, 2nd ed: London, Christopher Helm; 384.

- Smith, F. (1996). Biological diversity, ecosystem stability and economic development. *Journal of Ecological Economics*; 16: 191-203.
- Svensson, L.; Grant, P. (1999). *Collins Bird Guide*, 2rd ed: London, Harper Collins; 392.
- Williams, B.K. (1996). Assessment of accuracy in the mapping of vertebrate biodiversity. *Environmental Management*, 47: 269-282
- Wintoh, B.R.; Lessli, D.M. (1999). Relative abundance and diversity of Ciconiformens in north central Oklahoma. *Proc. Academic Society*. Volume 79, pp: 41-44.
- Yazdandad, H. (2011). A study on Diversity and abundance changes of birds in Khorasane Razavi water ecosystem, *Animal Environment*, 3:1. (in Persian)
- Yousefi, M.; Sheykhi Ilanloo, S.; Shokrane, M. (2015). Bird species richness in Bavanat County, north east of Fars province. *Experimental Animal Biology*; 4(2): 14, 69-78. (in Persian)